



Styczniowe liczenie wydry i bobra

Wydra

12 i 15 stycznia 2016 roku, w Drawieńskim Parku Narodowym, przeprowadzony został monitoring wydry. Wydra to zwierzę herbowe Parku, odnajdujące w nim świetne warunki do życia. Aby dowiedzieć się jaka jest liczebność tego ssaka, pracownicy Parku, zgodnie z metodyką, przeprowadzają co trzy lata kontrolę wszystkich potencjalnych miejsc przebywania tych zwierząt. Szczególnej kontroli podlegają wszelkie mosty, przepust, jazy i inne urządzenia hydrotechniczne zlokalizowane przy parkowych rzekach. Wydry lubią przebywać w okolicy takich miejsc i jak na ssaki z rodziny łasicowatych przystało, znakują je odchodami i wydzielinami zapachowymi z gruczołów okołoodbytowych. Podobnie zresztą czynią ssaki z rodziny psowatych czy kotowatych. Na terenie Parku, wyznaczona jest sieć stałych punktów monitoringowych, podlegających kontroli. Liczenie najlepiej jest przeprowadzić zimą. Obecność pokrywy śnieżnej znacznie ułatwia wykrywanie wydrzych śladów. Przeprowadzonej właśnie kontroli, podlegały punkty znajdujące się przy wszystkich ciekach Parku i wybranych jeziorach. Na podstawie obecności tropów, pozostawionych odchodów i wydzielin zapachowych, można stwierdzić obecność wydry na danym stanowisku. Całkowita liczebność wydr na terenie DPN, oscyluje w granicach 18-22 osobników.

Bóbr

Aby dowiedzieć się jaka jest liczebność bobrów na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, pracownicy Parku kontrolują wszystkie znane stanowiska położone w pobliżu większych cieków, jezior i kanałów. Podczas kontroli monitorowane są również wszelkie nowe stanowiska. Takie kontrole stanowisk bobrowych, przeprowadzono w styczniu, gdyż zima jest najlepszym do tego okresem. W trakcie przeprowadzania kontroli nor, żeremi i norożeremi, należy zarejestrować obecność zimochowów, czyli magazynów pokarmu. W okresie obfitości pokarmu, bobry ścinają mnóstwo gałęzi i transportują je w najbliższe okolice swojej kryjówki. Tak więc, obecność takiego zimochowu jest dowodem, że stanowisko jest zajęte przez rodzinę bobrową. W zależności od siedliska, bobry nie zawsze tworzą zimochowy. W przypadku gdy nie jest się w stanie stwierdzić obecności magazynu pokarmowego, za zajęte stanowiska uznaje się również te wszystkie, przy których widnieją ślady intensywnego użytkowania przez bobry, czyli: świeżo ogryzione gałęzie, ślizgi do wody czy świeżo naniesiony muł. Na podstawie posiadanych danych, można stwierdzić, że na terenie DPN występuje około 25 rodzin bobrowych. Zakłada się, że średnia wielkość rodziny bobrowej liczy cztery osobniki. Dlatego liczebność bobrów na terenie DPN, szacować można na około 100 osobników.



Data wydruku: 03.07.2024 23:27:41

Adres URL: <http://dpn.pl/aktualnosci/248-styczniowe-liczenie-wydry-i-bobra.html>